

認知症について

こじま脳神経外科・内科クリニック

236-0042 横浜市金沢区釜利谷東6-21-1

電話 045-791-3177

認知症はさまざまな原因で脳の機能が低下して物忘れ、感情障害、歩行障害、意欲低下、尿失禁などが現れます。

経験による記憶と知識による記憶

物忘れには2種類があり、たとえば人の顔は覚えているが名前がでないことがよくあります。この場合人の顔を覚えることは実体験による記憶で、名前を覚えることは知識に相当します。人は経験したことは記憶に残りやすいが

知識は脳の老化によって残りにくくなります。

経験したことが記憶できないようになったら要注意です。

原因

原因	症状
アルツハイマー病	脳の海馬の障害で記憶低下が始まります。エピソード記憶の障害(事象の起承転結を思い出せない、記憶が断片的になる)何を買いに来たか、何処においたかなどの障害がでます
レビー小体認知症	脳の前頭葉の障害が原因で、物忘れ以外に感情障害があります。おこりっぽい、大声をだすなどです。幻視、幻覚 繰り返起こる幻視に特徴
前頭葉・側頭葉萎縮症	物忘れ以外に感情障害がでます。無作法、礼儀の欠如、無関心、嗜好の変化に特徴
多発性脳梗塞	物忘れ以外に意欲低下、運動障害もでます 脳卒中後3ヶ月以内に物忘れが出現
正常圧水頭症	物忘れ・尿失禁・歩行障害が特徴です。

検査

物忘れ検査(長谷川式検査、かなひろいテスト)

病名	症状
アルツハイマー病	頭部CT・MRIで脳の海馬の萎縮があります。 PET検査で脳血流の低下、髄液のアミロイドBの低下
レビー小体認知症	頭部CT・MRIで脳の前頭葉の萎縮があります
前頭葉・側頭葉萎縮症	頭部CT・MRIで脳の前頭葉・側頭葉の萎縮があります。
多発性脳梗塞	頭部CT・MRIで小さな脳梗塞が多発したり脳全体の萎縮がでます
正常圧水頭症	頭部CT・MRIで脳室の拡大と脳室周囲の低吸収域が特徴です。

治療

病名	症状
アルツハイマー病	神経伝達物質であるアセチルコリンを増やすアリセプトの服用 アリセプトと同じ作用のレミニールも有効 興奮を抑えるメモリーの併用も有効です。 躁状態の興奮の時は抗痙攣剤ラミクタール50-100mgも有用 拒薬がある方にはパップ剤のリバスタッチも便利です。
レビー小体認知症	アリセプトの服用と興奮を抑える薬(漢方抑肝散など)の併用 NMDA受容体拮抗剤のメモリーも興奮を抑える作用があり アリセプトと併用可能です。興奮を抑えるためグラマリール、リシパダールなども効能があります。
前頭葉・側頭葉萎縮症	アリセプトの服用と興奮を抑える薬(漢方抑肝散など)の併用 メモリーの併用
多発性脳梗塞	脳梗塞、高血圧、高脂血症の治療と脳代謝を改善するサアミオンの服用
正常圧水頭症	シャント手術を行います。効果があるひとは劇的に改善します。 水頭症 のページを見てください。

治療薬

	種類	副作用
軽度から高度認知症	アリセプトD5mg～10mg	吐気、食欲不振 異常興奮
軽度認知症 脳梗塞による認知障害	レミニール	吐気
軽度認知症 服薬拒否の場合	リバスタッチ 4.5mg、9mg、13.5mg、18mg徐々に増量	かぶれ
高度認知症 前側頭葉萎縮型 異常興奮	メマリー5mg～20mg	めまい
軽度認知症 神経細胞の保護に有効	ツムラ抑肝散2.5g～7.5g	目だった副作用なし
異常興奮、暴言	グラマリール セロクエル	目だった副作用なし
夜間興奮、徘徊	リスパダール1～2mg レスリン ルーラン	目だった副作用なし
夜間せん妄	抗けいれん剤のラミクタール	目だった副作用なし

 [長谷川式認知症検査](#)

 [かなひろいテスト](#)